



# БИФИФОРМ®

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

БИФИФОРМ®

**Регистрационный номер:** П N013677/01

**Торговое название:** БИФИФОРМ®

**Группировочное название:** Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фэциум

**Лекарственная форма:** капсулы кишечнорастворимые

**Состав:**

1 капсула кишечнорастворимая содержит:

*Активные вещества:*

*Enterococcus faecium* 1 x 10<sup>7</sup> КОЕ

*Bifidobacterium longum* 1 x 10<sup>7</sup> КОЕ

*Вспомогательные вещества:*

Декстроза 154,1 мг, Закваска дрожжевая 17,5 мг, Рожкового дерева бобов камедь 12,5 мг, Магния стеарат 3,0 мг, Лактулоза 0,5 мг.

Состав капсульной оболочки:

Желатин 50,0 мг, Титана диоксид (1,0 мг)\*, Метакриловой кислоты и метилметакрилата сополимер [1:1] 2,2 мг, Метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] [30 % дисперсия] 7,7 мг, Тальк 5,6 мг, Макрогол-6000 1,5 мг, Соевых бобов масло 0,8 мг, Глицериды диацетилированные 0,3 мг.

\*масса титана диоксида включена в общую массу желатиновой капсулы

**Описание**

Твердые желатиновые капсулы номер 3 белого цвета. Содержимое капсулы – порошок светло-желтого с серым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Эубиотик.

**Код АТХ:** A07FA

**Фармакологические свойства**

Штаммы *Enterococcus faecium* и *Bifidobacterium longum*, входящие в состав препарата, являются естественными симбиотическими бактериями, населяющими желудочно-кишечный тракт. Препарат оказывает нормализующее действие на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника. Действие обусловлено как непосредственным прямым эффектом входящих в состав препарата компонентов (высокая антагонистическая активность в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов), так и опосредованным – стимуляция местного кишечного звена иммунитета (активация синтеза иммуноглобулина А, индукция синтеза эндогенного интерферона).

*Bifidobacterium longum* обладает высокой выживаемостью в кишечнике человека и высокой скоростью роста. Включение в препарат апатогенного энтерококка *Enterococcus faecium*, колонизирующего в норме тонкий кишечник, позволяет оказывать положительное воздействие на состояние и пищеварительные функции не только толстого, но и тонкого кишечника, особенно при наличии бродильной диспепсии и явлений метеоризма.

4545557-1

**Ferr@san**

**Показания к применению**

- диарея, вызванная острым и обострением хронического гастроэнтерита, ротавирусной инфекцией; антибиотик-ассоциированная диарея; диарея путешественника;
- в комплексной терапии острых кишечных инфекций;
- в комплексной терапии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как колит, синдром раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных расстройств функционального генеза;
- нормализация микрофлоры кишечника, лечение и профилактика дисбактериозов и поддержание иммунной системы у детей старше 2-х лет и взрослых;
- непереносимость лактозы;
- в составе комплексной стандартной эрадикационной терапии у пациентов с хеликобактерной инфекцией.

**Противопоказания**

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата Бициформ в период беременности и лактации считается безопасным, поскольку препарат не всасывается и не оказывает системного действия.

**Способ применения и дозы**

При острой диарее препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить в дозе 2-3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов.

Для нормализации микрофлоры кишечника и поддержки иммунной системы препарат назначают в дозе 2-3 капсулы в сутки 10-21 день.

Пациентам с непереносимостью лактозы рекомендуется принимать препарат по 1 капсуле 3 раза в сутки. При проведении эрадикационной терапии Бициформ назначают по 2 капсулы 2 раза в день на протяжении двух недель с первого дня эрадикационной терапии.

Детям с 2-х лет по 1 капсуле 2-3 раза в день. Если ребенок не может проглотить капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое с небольшим количеством жидкости.

**Побочное действие**

При применении в рекомендуемых дозах по установленным показаниям побочные эффекты не выявлены.

**Передозировка**

Симптомы передозировки ранее не зарегистрированы. В случае значительного превышения рекомендуемых доз целесообразно медицинское наблюдение.

**Взаимодействие другими лекарственными препаратами**

Препарат может быть использован в сочетании с другими лекарственными препаратами. Разрешается одновременное назначение с антибиотиками.

**Особые указания**

Препарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. Меры предосторожности: не следует превышать максимальную суточную дозу.

**Форма выпуска**

Капсулы кишечнорастворимые. По 20, 30 или 40 капсул в алюминиевом пенале, закупоренном полиэтиленовой пробкой с контролем первого вскрытия, содержащей осушитель. По 1 пеналу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Транспортирование**

При температуре не выше 25 °С.

**Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

«Ферросан А/С», Дания, ДК-2860, Сэборг, Судмаркен 5

**Представительство Компании:**

«Ферросан Интернейшнл А/С», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16  
Тел./факс: (495) 737-36-95

Все претензии по качеству направляются в адрес Представительства.

**Ferrosan**