

**Регистрационный номер:** P № 002146/01-2003

**Торговое название препарата:** [Диклофенак-Акри®](#)

**Международное непатентованное название (МНН):** [диклофенак](#)

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

#### **Состав**

В 100 г мази содержится:

Активные вещества: диклофенак натрия - 1,0 г.

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400, пропиленгликоль, кислота янтарная, димексид.

#### **Описание**

Мазь от белого до белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом. Допускается наличие перламутровых разводов.

#### **Фармакологические свойства**

**Фармакотерапевтическая группа:** Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС).

Мазь Диклофенак-Акри оказывает местное противовоспалительное и обезболивающее действие. Ингибируя синтез простагландинов, препарат уменьшает боль, вызванную воспалением, отеки и гиперемию.

При местном применении вызывает ослабление или исчезновение болей в месте нанесения мази, в том числе болей в суставах в покое и при движении, уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов. Способствует увеличению объема движений.

#### **Показания к применению**

Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов; ревматизм мягких тканей; травматические ушибы, растяжения связок, мышц и сухожилий; воспалительные отеки мягких тканей, болезненность мышц и суставов, вызванные тяжелыми физическими нагрузками.

#### **Противопоказания**

Известная повышенная чувствительность к диклофенаку, димексиду и компонентам препарата; бронхиальная астма, крапивница или ринит, спровоцированные применением ацетилсалициловой кислоты (салицилатами) или другими НПВС; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения; беременность и период грудного вскармливания; в детском возрасте до 6 лет.

#### **Предостережение**

Следует избегать попадания мази Диклофенак-Акри на поврежденную поверхность кожи, открытые раны, глаза и другие слизистые оболочки.

Перед использованием мази Диклофенак-Акри следует проконсультироваться с врачом, если у Вас:

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в анамнезе;
- нарушение функции печени и почек;
- выраженные нарушения системы кроветворения;
- бронхиальная астма, ринит, полипы слизистой носа;
- аллергические реакции в анамнезе.

Не следует использовать мазь Диклофенак-Акри у детей до 12 лет без консультации врача.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Следует проконсультироваться с врачом перед применением мази, если Вы находитесь под наблюдением врача или применяете другие НПВС.

### **Способ применения и дозы**

НАРУЖНО!

Мазь 2-4 г наносят тонким слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза мази не должна превышать 8 г. Продолжительность курса лечения не должна превышать 10 дней без консультации врача.

### **Побочные действия**

Возникающие побочные эффекты зависят от индивидуальной чувствительности, величины применяемой дозы и продолжительности лечения. Возможны аллергические реакции со стороны кожи (кожная сыпь, жжение, покраснение). При длительном применении мази и/или применении больших количеств могут возникнуть системные побочные эффекты: со стороны желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастральной области, тошнота, метеоризм, потеря аппетита); со стороны центральной нервной системы (головная боль, головокружение, сонливость); со стороны дыхательной системы (бронхоспазм, системные анафилактические реакции, включая шок). При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Симптомы:

Клиническая картина определяется нарушениями со стороны центральной нервной системы (головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, явления гипервентиляции с повышенной судорожной готовностью, у детей - миоклонические судороги) и желудочно-кишечные нарушения (боли в животе, тошнота, рвота). Могут возникнуть кровотечения из желудочно-кишечного тракта и/или нарушения функции печени и/или почек.

Лечение: симптоматическое.

### **Форма выпуска**

Мазь в алюминиевых тубах по 20 г, 30 г, 40 г или 50 г и в банке по 50 г.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 12 до 15°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

### **Отпуск из аптек**

Без рецепта врача.

### **Производитель**

ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН", Россия.

142450, Московская обл., г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29.

Тел./факс: (495) 702-95-03.