

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ГАСТРАЦИД®

Регистрационный номер:

Торговое название:

Гастрацид®

Международное непатентованное название или группировочное название:

Алгелдрат + Магния гидроксид

Лекарственная форма:

Таблетки жевательные

Состав на одну таблетку:

Активные вещества:

Магния гидроксид - 400,00 мг

Алгелдрат (Алюминия оксид гидратированный) - 400,00 мг

в пересчете на алюминия оксид - 214,00 мг

Вспомогательные вещества: маннитол 10,00 мг, сорбитол 183,00 мг, натрия сахаринат 3,00 мг, сахароза 186,40 мг, крахмал кукурузный 5,60 мг, ароматизатор мятный 10,00 мг, магния стеарат 6,00 мг.

Описание:

Таблетки круглые.

Таблетки плоские круглые со скошенным краем белого или белого с серовато-желтовато-зеленоватым оттенком цвета, с легким запахом мяты, на обеих сторонах гравировка NP на фоне дерева.

Таблетки квадратные.

Таблетки плоские квадратные со скошенным краем белого или белого с серовато-желтовато-зеленоватым оттенком цвета, с легким запахом мяты, на обеих сторонах гравировка NP на фоне дерева.

Фармакотерапевтическая группа: Антацидное средство

Код АТХ: A02AX

Фармакологическое действие:

Комбинированный препарат для устранения изжоги и боли в желудке, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Алгелдрат оказывает антацидное, адсорбирующее, обволакивающее, ветрогонное действие. Магния гидроксид оказывает легкое послабляющее действие.

Препарат нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, снижает активность желудочного сока; инактивирует пепсин и связывает желчные кислоты, попадающие в желудок в результате рефлюкса из 12-перстной кишки, оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки; ускоряет моторику желудка и всех отделов кишечника. Не вызывает вторичную гиперсекрецию соляной кислоты и алкалоз.

Фармакокинетика:

Абсорбция - низкая.

Показания для применения:

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения.
- Острый гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, острый дуоденит.
- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит.
- Дискомфорт, изжога и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после приема лекарств, в том числе глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов, а также после употребления кофе, никотина, алкоголя.

Противопоказания для применения:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы / изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Гипофосфатемия, выраженное нарушение функции почек, детский возраст до 10 лет, болезнь Альцгеймера, беременность.

С осторожностью: в период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Таблетки следует разжевывать и держать во рту до полного рассасывания.

Взрослым и детям старше 15 лет: по 1-2 таблетки 4 раза в сутки через 1 час после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги. При язвенной болезни желудка препарат необходимо принять за 30 мин до приема пищи. Максимальная суточная доза – 12 таблеток.

Детям от 10 до 15 лет назначают половину рекомендованной дозы для взрослых.

Для профилактики - по 1 таблетке за 15 минут до приема лекарств, раздражающих слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Продолжительность лечения не должна превышать 15-20 дней.

Побочное действие:

Запор, тошнота, рвота, боли в желудке спастического характера, изменение вкусовых ощущений, гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью – жажда, снижение артериального давления, гипорефлексия.

Передозировка:*Симптомы*

Образование камней в почках, появление тяжелых запоров, сонливость, гипермагниемия. Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения, онемение или боль в мышцах, нервозность и быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения.

Лечение

Необходимо сразу предпринять меры по быстрому выведению препарата: промыть желудок, вызвать рвоту, принять активированный уголь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Может адсорбировать некоторые лекарственные средства, уменьшая, таким образом, их всасывание. Снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов H₂-гистаминовых рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунисала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, хинолонов (ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепафлоксацина и др.), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямым антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, залцитабина, желчных кислот – хенодезоксихолевой и урсодезоксихолевой, пенициллина, препаратов железа и лития, хинидина, лансопразола, мексилетина, кетоконазола.

При одновременном приеме с препаратами, покрытыми кишечнорастворимой оболочкой, повышенная щелочность желудочного сока может привести к ускоренному нарушению оболочки и вызвать раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки.

M-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата.

Особые указания:

Интервал между приемом препарата Гастрацид® и других лекарственных средств должен составлять 1-2 часа.

При более длительном применении (более 20 дней) необходим регулярный врачебный контроль. Препарат содержит сорбитол, который противопоказан при врожденной непереносимости фруктозы.

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и занятием другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска:

Таблетки жевательные.

Для круглых таблеток: по 10 таблеток в блистере ПВХ/Al; по 1, 2, 3, 4, 5 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.

Для квадратных таблеток: по 4, 6, 8 таблеток в блистере ПВХ/Al; по 1, 2, 3, 4, 5 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.

Срок годности:

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

Натур Продукт Европа Б.В.,

Твейберг 17, 5246 XL Розмален, Нидерланды

Представительство в России/Адрес организации принимающей претензии:

ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»

194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, литер А

Тел.: 8-800-100-03-08 (Звонок по России бесплатный).

Представитель фирмы:

Директор медицинского департамента

ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»



И.В. Каулина - Оржешковская