

ГАСТРО-НОРМ®
bismuth subcitrate
Таблетки по 120 мг

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение препарата! Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобится перечитать его. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом. Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам. Это может нанести ущерб их здоровью, даже если симптомы их заболевания подобны тем, которые наблюдаются у Вас.

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 1 таблетка содержит висмута субцитрата коллоидного в пересчете на 120 мг Bi_2O_3 ;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный или кукурузный, кальция стеарат, натрия кроскармеллоза.

Лекарственная форма. Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа. Средство для лечения пептической язвы.

Фармакологические свойства. Препарат образует на поверхности язв и эрозий желудка защитную пленку, которая способствует их рубцеванию и защищает от влияния желудочного сока; увеличивает синтез биологически активных веществ, стимулирует образование слизи и бикарбонатов, снижает активность пепсина и пепсиногена, имеет бактерицидную активность относительно *Helicobacter pylori*.

Показания. Неязвенная диспепсия, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, хронический гастрит, дуоденит в стадии обострения, в схемах лечения эрадикации *Helicobacter pylori*.

Противопоказания. Препарат противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, во время беременности и в период кормления грудью, а также детям до 3 лет.

Предостережения при применении.

Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом!

Не рекомендуется длительное применение препарата из-за возможности развития обратимой энцефалопатии. Во время лечения препаратом следует контролировать функции почек и концентрацию висмута в крови и моче, а также воздерживаться от употребления алкоголя. Сульфид висмута, который образуется в результате приема Гастро-Норма, может вызвать почернение кала, что не влияет на качество лечения. За 30 мин до и после приема препарата необходимо воздерживаться от употребления жидкости, в частности молока, твердой пищи, антацидных препаратов. Поскольку прием препарата может вызвать тошноту, головную боль и плохое самочувствие, следует воздержаться от управления автотранспортом или другими

опасными механизмами.

Взаимодействие с лекарственными средствами.

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата.

При одновременном применении Гастро-Норма[®] уменьшается всасывание тетрациклина.

При применении вместе с препаратами, содержащими висмут, возрастает риск повышения концентрации висмута в крови.

Способ применения и дозы. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки за 30 мин до еды и 4-й раз - перед сном. Таблетку запивать 1 - 2 глотками воды (только не молоком). Срок лечения - 4 - 6 недель. После этого следует сделать перерыв на 8 недель и не использовать препараты, содержащие висмут.

Схема лечения эрадикации *Helicobacter pylori*: Гастро-Норм[®] 120 мг 4 раза в сутки + ингибиторы «протонного насоса» в стандартной дозе + метронидазол 500 мг 3 раза в сутки + тетрациклин 500 мг 4 раза в сутки в течение 7 дней.

Детям назначают в таких дозах Гастро-Норма[®]:

с 3 до 12 лет - по 1 таблетке (120 мг) 2 раза в сутки;

12 лет и старше - по 2 таблетки (240 мг) 2 раза в сутки.

При частом применении препарата, возможно развитие обратимой почечной недостаточности, симптомы которой могут появиться через 10 дней и позже.

В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.

Побочные эффекты. Возможны тошнота, головная боль, диарея, плохое самочувствие, редко - зуд, высыпания на коже.

В случае возникновения любых необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата!

Срок годности. Срок годности препарата составляет 3 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре 15 - 25 °С.

Упаковка. Таблетки № 50 x 2, или № 10 x 2, или № 10 x 4 в контурно-ячейковых упаковках, в пачках.

Правила отпуска. По рецепту.

Производитель. Корпорация «Артериум», ОАО «Галичфарм».