

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Хондроитин-АКОС

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Хондроитин-АКОС

Группировочное наименование: Хондроитина сульфат &

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г мази:

Активное вещество: хондроитина сульфат натрия (в пересчёте на сухое вещество) - 5,0 г;

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид (димексид) - 10,0 г, ланолин (ланолин безводный) - 15,0 г, вазелин (вазелин медицинский) - 50,0 г, вода очищенная - до 100,0 г.

Описание. Мазь светло-жёлтого цвета с запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор

Код АТХ: M01AX25

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Высокомолекулярный мукополисахарид, замедляющий резорбцию костной ткани и снижающий потерю кальция. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы её восстановления, тормозит процессы дегенерации хрящевой и соединительной ткани. Подавляет ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует регенерации суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. В виду своей структурной близости к гепарину, препятствует образованию фибриновых тромбов в синовиальном и субхондральном микроциркуляторном русле. Уменьшает болезненность и увеличивает подвижность пораженных суставов.

Замедляет прогрессирование остеоартроза.

Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и фибринолитическое действие, способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны.

Фармакокинетика

Практически не обладает системной абсорбцией.

Показания к применению

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника - остеоартроз с преимущественным поражением крупных суставов, межпозвоноквый остеохондроз.

Противопоказания

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения.

С осторожностью

Не использовать мазь Хондроитин-АКОС без консультации врача при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

При беременности и в период грудного вскармливания (лактации) мазь Хондроитин-АКОС назначается только после консультации врача и с осторожностью, длительность лечения определяет врач.

Способ применения и дозы

НАРУЖНО!

Мазь Хондроитин-АКОС наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3 минут до полного впитывания. Курс лечения 2-3 нед. При необходимости курс лечения повторяют.

В тяжёлых случаях одновременно назначают препараты хондроитина сульфата для приема внутрь или для внутримышечных инъекций.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические реакции, при этом препарат отменяют.

Если Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При наружном применении мази Хондроитин-АКОС передозировка маловероятна (вследствие отсутствия системной абсорбции препарата). К настоящему времени о случаях передозировки мази Хондроитин-АКОС не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не установлено случаев негативного лекарственного взаимодействия при назначении мази на фоне терапии другими лекарственными средствами, включенными в общепринятые схемы лечения дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

Особые указания

Следует избегать попадания мази на слизистые оболочки и открытые раны.

Не использовать препарат без консультации врача в возрасте до 18 лет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Мазь Хондроитин-АКОС не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного концентрированного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5 %.

По 30, 50 г в тубы алюминиевые с навинченными полимерными бушонами.

1 тубу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищённом от света месте при температуре от 2 °С до 20 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/производитель/организация, принимающая претензии:

Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез").

640008, Россия, г. Курган, пр. Конституции, 7

Тел./факс: (3522) 48-16-89

E-mail: real@kurgansintez.ru

Интернет-сайт: <http://www.kurgansintez.ru>

Представитель ОАО «Синтез»



В.И.Петухов